



השפעת מועד הגדיד, משטר השימור ומשך האחסון על איכות הפרי ביום הוצאתו.

פירות הוצאו מהשימור במועדים שונים והיקף הנזק לפרי נקבע. התוצאות מוצגות באיורים 1 ו-2. יש לזכור שבכל מועד הוצאה מהפריזר, פרי מראשית הגדיד שהה באחסון כ- 6 שבועות יותר מפרי מסוף הגדיד.

בכל איור מוצגת גם לחות הפרי בעת הכניסה לתהליך השימור. נזק מוגדר כאחוז משטח פני הפרי המכוסה בצברי גבישים ושילפוח.




**איור 1:** מידת הנזק לפרי מראשית הגדיד לאחר תקופות אחסון שונות – השפעת תנאי השימור.




**איור 2:** מידת הנזק לפרי מסוף הגדיד לאחר תקופות אחסון שונות – השפעת תנאי השימור.

השפעת מועד הגדיד ומשטר השימור על חיי המדף של הפרי לאחר הוצאתו.

פירות הוצאו מהשימור ב- 9/6/03 ואוחסנו בחדר (25-30 °C). היקף הנזק נקבע ביום ההוצאה ובמספר מועדים במהלך האחסון בחדר. יש לזכור שבמועד ההוצאה, פרי מראשית הגדיד שהה באחסון כ- 6 שבועות יותר מפרי מסוף הגדיד. באיורים נזק מוגדר כאחוז מכלל שטח פני הפרי המכוסה בצברי גבישים ושילפוח.



**איור 3:** מידת הנזק לפרי מראשית הגדיד שהוצא ב- 9/6/03 – השפעת תנאי השימור על חיי המדף.



**איור 4:** מידת הנזק לפרי מסוף הגדיד שהוצא ב- 9/6/03 – השפעת תנאי השימור על חיי המדף.